

PERIORAL[®]

PROFESSIONAL

FLACONE CON SISTEMA AIRLESS
MASSIMA PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
ALTERNATIVA ALLA CLOREXIDINA

MAXI FLACONE
DA 50ML



Ingredienti attivi

OLIO D'OLIVA EVO OZONIZZATO ATTIVATO

ottima concentrazione di
ozono che innesca una
attività rigenerante,
antisettica, antinfiammatoria

CETILPIRIDINIO

un'ottima attività antisettica
e battericida

CLORFENESINA

antimicrobico, miorilassante

COLLAGENE

a basso peso molecolare
facilmente assorbibile,
rigenerante cellulare

ACIDO IALURONICO

basso ed alto peso molecolare
rigenerante cellulare



NICKEL TESTED



NO GLUTINE



NO LATTOSIO



PERIORAL[®]

PROFESSIONAL



Dosaggio

Il dosaggio dipende dall'applicazione nella zona interessata.

Modalità di utilizzo

Il flaconcino è dotato di un tappo con erogatore, prendere una siringa monouso da almeno 3ml, rimuovere lo stantuffo posteriore, veicolare il PERIORAL-3 all'interno della siringa e poi rimettere lo stantuffo. Si può utilizzare un ago smusso. Il gel va applicato sulle zone interessate, il paziente non deve risciacquare o assumere cibi per i successivi 30 minuti e non dovrebbe assumere cibi solidi nelle 3 ore seguenti.

Tasche parodontali



Nella cura delle patologie parodontali, applicare nelle aree sottogengivali al termine della seduta di trattamento in ambulatorio.



Applicazione di PERIORAL-3 su spugnetta di fibrina in chirurgia

Applicazioni professionali post-chirurgia di Perioral-3 applicato in sito alla dimissione del paziente



Fine seduta chirurgica



2 controllo ferita dopo 7 giorni con protocollo domiciliare Ialozon Blu collutorio associato a Ialozon gel orale



3 controllo a 15 giorni dopo aver seguito il protocollo Ialozon Blu associato a Ialozon gel orale